

¹ Êëàààēñ — ôîðäîââ ìàðëà êëàðëèðîî³œëíó âèðîáíáíëöòââ “RANBAXY” (îá³ÿ).

Kē³ f³ ÷ f³ ðāçœuðaðœ. Āfāñ³āfē t̄dīāāāāfīā ēʼœðāāfīy ēēaðœðœfīl³ ðē-
fīl³ ō ðāf̄ðœð fā ðīf̄çēēf̄ ðāðēf̄āñ³ ðā āf̄ñðœē āðf̄f̄ð³ fā āððāō āf̄āō ēʼœðāāfīy f̄t̄
l³ æççōāāēēñũ ðāf̄ f̄āððāððā ðʼœā, ðāñf̄f̄ðā ē ʼf̄f̄āf̄ñēāf̄ñũ ēāðœp çīā÷f̄l³ çf̄çēēēñũ.
f̄ā 3—4 āf̄āō ēʼœðāāfīy āf̄ē³ ā f̄āðœ³ ðā çā ðððāēf̄f̄ çf̄ēēāēē. f̄ā 5—6 āf̄āō ðāðāf̄
ēāðœñũ f̄ēāā, f̄ā ðāñ āññœðœuðaðœ; ēāāāf̄l³ t̄dīñœðf̄f̄āāāāññũ āāçœœœyðf̄ āēðāf̄l³.
Ā f̄āf̄f̄ā t̄ðāf̄t̄ñāf̄ ðāðāç 6 āʼā ēʼœðāāfīy çāāðʼāāēēñũ ñōāðāāðœēñũ ðā f̄ā f̄āððāððā³

[illegible]

[illegible][illegible]

Âàð³àíòè ìðèçíà÷áííýàíòèáàèðåð³àëüíèõ ìðåíàððàò³â
 çòáàððáâáííýì å³³ååí³êëâ³÷íì; ñèòóàò³;

Епідеміологічна ситуація	Збудник	Антибіотик	Препарат
Епідемія грипу	Вірус + стафілокок	Напівсинтетичні пеніциліни, в тому числі з клавулановою кислотою	Енханцин
		Цефалоспорины 1-го і 2-го покоління	Споридекс
			Рефлін
			Верцеф
		Аміноглікозиди	
		Фторхінолони	Заноцин
			Цифран
		Карбапенеми	
Спалах ангіни	Стрептокок	Напівсинтетичні пеніциліни, в тому числі з клавулановою кислотою	Енханцин
		Цефалоспорины 1-го і 2-го покоління	Споридекс
			Рефлін
			Верцеф
		Макроліди	Клабакс
Спалахи невірусної інфекції	Мікоплазма Хламідії	Макроліди	Клабакс

- ◆ $\text{ĩáí}^3\text{òèè}^3\text{ííàèé} + \text{àí}^3\text{ííàè}^3\text{éíçèáíèé} \text{ àíòèá}^3\text{íòèé}$
- ◆ $\text{òǎòàèíñííðèííàèé} \text{ 1-; } \text{ǎáíǎðàð}^3; + \text{àí}^3\text{ííàè}^3\text{éíçèáíèé} \text{ àíòèá}^3\text{íòèé}$
- ◆ $\text{òǎòàèíñííðèííàèé} \text{ 2-; } \text{ǎáí} \text{ 3-; } \text{ǎáíǎðàð}^3; + \text{ìàèðíè}^3\text{áíèé} \text{ àíòèá}^3\text{íòèé}$
- ◆ $\text{ĩáí}^3\text{òèè}^3\text{ííàèé} \text{ (òǎòàèíñííðèííàèé)} + \text{àí}^3\text{ííàè}^3\text{éíçèáíèé} + \text{èè}^3\text{íǎàì}^3\text{òèí}$
- ◆ $\text{òòíðð}^3\text{ííèíí} + \text{àí}^3\text{ííàè}^3\text{éíçèáíèé} \text{ àíòèá}^3\text{íòèé}$
- ◆ $\text{òòíðð}^3\text{ííèíí} + \text{ìàèðíè}^3\text{áíèé} \text{ àíòèá}^3\text{íòèé}$
- ◆ $\text{òǎòàèíñííðèííàèé} \text{ 2-; } \text{ǎáí} \text{ 3-; } \text{ǎáíǎðàð}^3; + \text{èè}^3\text{íǎàì}^3\text{òèí}$
- ◆ $\text{òòíðð}^3\text{ííèíí} + \text{èè}^3\text{íǎàì}^3\text{òèí}$
- ◆ $\text{ìàèðíè}^3\text{áíèé} \text{ àíòèá}^3\text{íòèé} + \text{ĩáí}^3\text{òèè}^3\text{ííàèé} \text{ àíòèá}^3\text{íòèé}$
- ◆ $\text{ìàèðíè}^3\text{áíèé} \text{ àíòèá}^3\text{íòèé} + \text{ðèòàì} \text{ í}^3\text{òèí}$
- ◆ $\text{òòíðð}^3\text{ííèíí} + \text{òǎòàèíñííðèííàèé} \text{ 2-; } \text{ǎáí} \text{ 3-; } \text{ǎáíǎðàð}^3; \pm \text{èè}^3\text{íǎàì}^3\text{òèí}$
- ◆ $\text{àìíèñèòèè}^3 \text{ ç } \text{èèáàòèàííáì} \text{ èèñèòòì} \text{ þ } + \text{àí}^3\text{ííàè}^3\text{éíçèáíèé} \text{ àíòèá}^3\text{íòèé}$
- ◆ $\text{àí}^3\text{ííàè}^3\text{éíçèáíèé} \text{ àíòèá}^3\text{íòèé} \pm \text{èàðááíǎíáì} \pm \text{ǎáíèí} \text{ í}^3\text{òèí}$

Вибір антибактеріальної терапії
з урахуванням особливостей клінічної
симптоматики

Клінічні особливості	Збудник (шлях визначення)	Антибіотик	Препарат
Початок із загальних симптомів інтоксикації, на 2-гу добу поява кашлю, кровохаркання - іржавої мокроти, болей у грудній клітці при вдиху, кашлі; фізикально: притуплення, посилення голосового дрижання, крепітація; є ефект від пеніцилінів	Пневмокок (посів + титри антитіл)	Напівсинтетичні пеніциліни, у тому числі з клавулановою кислотою	Енханцин
		Цефалоспорины 1-го і 2-го покоління	Споридекс
			Рефлін
			Верцеф
Часто на фоні грипу, в стаціонарі, часто поява порожнинних утворів - бул і абсцесів; часто резистентність до пеніциліні	Стафілокок (посів + титри антитіл)	Макроліди	Клабакс
		Напівсинтетичні пеніциліни з клавулановою кислотою	Енхацин
		Цефалоспорины 1-го і 2-го покоління	Споридекс
			Рефлін
			Верцеф
		Аміноглікозиди	
		Фторхінолони	Заноцин Цифран
Зв’язок з ангіною, при сепсисі можливе абсцедування - дрібні порожнини; може бути резистентність до пеніциліну	Стрептокок (посів + титри антитіл)	Напівсинтетичні пеніциліни з клавулановою кислотою	Енханцин
		Цефалоспорины 1-го і 2-го покоління	Споридекс
			Рефлін
			Верцеф
Неспецифічні симптоми, характерні для кокової інфекції; високий ступінь інтоксикації; гнійні ускладнення (плеврит, синусит і т. ін.); виражені запальні зміни у крові	Пневмокок Стафілокок Стрептокок	Див. вище	
Немає ефекту від пеніциліну; бідна аускультативна симптоматика при (часто) дольовому ураженні на рентгенограмі; густа в’язка мокрота, іноді у вигляді "малинового желе"; ефект від аміноглікозидів і цефалоспоринів	Клебсієла (посів + титри антитіл)	Цефалоспорины 1-3 покоління	Споридекс
			Рефлін
			Верцеф
			Офрамакс
При виїзному характері роботи (готелі, гуртожитки), робота у складських, промислових приміщеннях, при монтажі; у приміщеннях із кондиціонерами; часто полісегментарні ураження;неефективність пеніцилінів, аміноглікозидів, цефалоспоринів; ефективні макроліди	Легіонела (лише за титрами антитіл)	Аміноглікозиди	
		Карбапенеми	
У молодих, в організованих колективах; як при ГРВІ - епідемічний характер поширення; високий ступінь інтоксикації при мінімальних аускультативних і рентгенологічних змінах (посилення легеневого рисунку); ефективні макроліди і тетрацикліни	Макроліди	Макроліди	Клабакс
		Рифампіцин	
У молодих, в організованих колективах; як при ГРВІ - епідемічний характер поширення; високий ступінь інтоксикації при мінімальних аускультативних і рентгенологічних змінах (посилення легеневого рисунку); ефективні макроліди і тетрацикліни	Мікоплазма, хламідії (лише за титрами антитіл)	Макроліди	Клабакс
Завжди вторинна пневмонія, з гнійним ураженнямі відповідною зеленою мокротою; на фоні гнійного бронхіту, бронхоектазів; при неодноразовому лікуванні антибіотиками; з резистентністю до пеніциліну; при ефективності цефалоспоринів 2-го і 3-го покоління, аміноглікозидів, фторхінолонів	Кишкова паличка Синьогнійна палочка Протей (посів + титри антитіл)	Цефалоспорины 2-го і 3-го покоління	Верцеф
			Офрамакс
		Аміноглікозиди	
		Фторхінолони	Заноцин
			Цифран
Клініка інфекційних, автоімунних і алергічних уражень при вроджених імунодефіцитах; клініка онкологічних, гематологічних захворювань і у хворих з трансплантацією органів, які отримують цитостатики, при СНІДі	Pg(-) флора Грибки (посів + титри антитіл) Пневмоциста (мікроскопія) Цитомегаловірус (титри антитіл)	Цефалоспорины 2-го і 3-го покоління	Верцеф
			Офрамакс
		Аміноглікозиди	
		Фторхінолони	Заноцин
			Цифран
		Антимікотичні препарати	
		Ко-тримоксазол	Ранкотрим
		Ацикловір	Ловір