

Ì è íáñòàæèè 67 òáíðèò íà ʹí òáèòʹéíçàæáíò áðííòʹæùíò áñòíò áʹéíí àʹà 18 áí 58 òíèʹ. Ò áñò òáíðèò íðè áàèòàðʹíèíʹ-ííò áíñèʹáæáíʹ òàðèíðèíʹí ááí áðííòí-æùááíèʹýðííáí çí èáò àèʹáéíáí ððèááè òíáʹá *Candida* òà *Aspergillus*. Òñò òáíðèò áóéí ííáʹéáí íá 3 áðòíè: ² áðòíá — 20 íñá, 0 éíí íèàèñíò òáðáíʹp ýèòè áòíàèà èèòèòèáí íí 50 íà ááʹ³ íà ááííò òíðííáíæí 14 áíʹá; ²² áðòíá — 24 íàòʹ³ íòè

²²² ãđóĩà — 23 ïàö³⁰íòè, ÿê³ îòðè ì óâàèè áàçîâó òâðàĩ³p áđî íõ³äëüí î; àñò ì è.

20—29 11 — 11çèèèà1p (++) , 29 11 3 áéúøå — 11çèèèà1p (++). Åðèà1àò1ç¹³
 àà 1áñò³ééè ðààèò³; ð1çæýäàèè èè ñó1 1á1¹³ 1á àðàð1áóààèè.

Đảợöüòàòè òà ÿ ô â ã â â đả í í ÿ

īdeāēēēī ī ō 30% ōāīdeō. ī³ā āīēēāī ī ēēōāīīy ī³ēīēā³-īā ēāōēīā ōāēīōēīīy
īī÷āēā čīā÷īī ā³āō³čīyōēñy ā ō³čīēō āōōīāō.

ɔ̃õõ ɪ̃ɔ̃ɔ̃ (80% — ɔ̃ñõ ɔ̃ɔ̃ñõɔ̃ɔ̃ɔ̃, 20% — ɪ̃ɪ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃). ʒ̃ɔ̃ñõɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ ɔ̃ ɪ̃ñõɔ̃ɔ̃-
 ɪ̃õ ɔ̃ɔ̃ ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ ɔ̃ñõ ɔ̃ñõɔ̃ɔ̃ ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ ɔ̃ 16,7% ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ (58% — ɪ̃-
 ɪ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ ɔ̃ñõ ɔ̃ɔ̃ ɪ̃ɪ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃), ɔ̃ ɔ̃ɔ̃ñõɔ̃ɔ̃ɔ̃ ɔ̃ñõ ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ ɔ̃
 ɔ̃ɔ̃ ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃, ɪ̃ ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃ɔ̃.

ḏāḳōēwōdāde āīnē³āēāīīy īā īāēā āāāēdāde āīnōīā³ḏēīē. Īḏīdā 6 2³ 3 āīḏēō, 6 yēēō āōēī āēyāēāīy Ḑ³nō ōēō āḏēāēā³ yē³ īḏēīōāāēē āēōēpēāī, āīnyāīōōī nāīāō³, īīēḏīōde. Īāōī³nōū ō āāīō³īēōō āḏōīāō ēāḏōēīā īā ḱī³īēēāny.

Candida albicans.

èànu³ iòáíñeáí³ñou i'çeðeàíeò øé'ðíeò i'ðíá áí àeàçáíáí àeàðááíó, ááuí çá'eu-
 øeèañy -añòeà òáíðeò³ ç íááàòeáíeì øé'ðíeìe i'ðíáàìe. O²² áðóí³, áá i'àò³⁰ iòe
 íááðæóáàè³ ø³ i'ðíòeáðeáéíá³ i'ðáíàðàòe, òà á²²² (éííòèíeúí'é) áðóí³ çì³ òeò
 i'íeàçíeè³á íá á'ááóáàéíñy.

nèou àenfièèi, àeà 1^a àièeàii àeòèpèaíó à³àçía-àeàñú nò³eèà 1ⁱçèòeàíà oáí-
 àáíóy — yèu í ài è³eòàáííy íáààòeàí³ ðáçóèuòàòe àeyàeyèè ó 10%, 1ⁱçèòeàí³ “+” ó
 20%, “++” — ó 40%, “+++” — ó 30%, òí 1ⁱñey è³eòàáííy ó³ 1ⁱèaçíeèè nòáííàèèè
 à³íáíàí³ 20%, 40%, 30%³ 10%. Íàòí³ñòú à³íøèò oáíðèò è òúíáí íà ñííñoàð³-
 ààeè. Àðàòíàò-è íàçía-íó è³èyèññòú oáíðèò³ ç íayáíñòò 1ⁱçèòeàíèò øèðíèò 1ⁱðía
 àí àðeàè³ ðíàò *Aspergillus*, è íà 1ⁱíààí 1ⁱðíàòe à³ðíà³ àenfiàèè.

yāēyēīnū ó çlāīðāīʿ +añoīðò ìatāāʿā yāōōē, èaøēp, ēʿēuēīnò ðāðēīðēīʿy, īī-
ēʿīðāīʿ īīēāçlēēʿā çlāīʿð fūīfāī æðāīʿy īīðʿāīʿyī ç ðāīðēīè 22 òà 222 āðōī.

Í³ááéààp÷è í³añòì íê, ì íæ íá ò áãðàè ò è, ù í çàñ ò ì ñòáá ííý àè ò-
èpèáí ò á é ì ì íèáèñ í³é ò áðàí³; òáí ðèò í á³í ò áèò³é ì í çàèáé í ò áð í í-
ò³àèüí ò áñ ò ì ó³ ñóí ò ò í³ì è ì³é í ò è ÷ í è ì è ò ðàæá í íý ì è àè ò àèüí è ò
ø èý ò³á çáááç í á÷ ò³ ñáí á ò³p ò áð è í ò è í íý (í ñ í á è è á ù í á í á ð è á é á³á
ð í á ò Candida) ò á ç ì á í ò ò³ ñáí ñ è á³é ç à ò³p í ð á á í³ç ì ó á í á ð è á é í á è ò
à è á ð á á í³á, ù í ñ í ð èý³ ò í è³í ò á í í p í á ð á á³á ò ç à ð á í ð p á á í íý. Ò á à ò³
í³añ ò á á ò ð á è í ì á í á ó á à ò è à è ò è p è á í ý è í ð á í á ð à ò à è á í ð ò à è ý ò á í-
ð è ò³ á è ù á ç à ç í á ÷ á í í p ò ñ è è á á í á í p í à ò í è í á³ò p.